

Joet  
Stationsstraat 27C  
6741 DH Lunteren  
[joet@joet.nl](mailto:joet@joet.nl)  
0628428852

Lunteren, 11-02-2024

Bijwerkingencentrum Lareb  
T.a.v. Marc Eyck  
Goudsbloemvallei 7  
5237 MH 's-Hertogenbosch

Betreft: VERZENIO- abemaciclib tablet van Eli Lilly and Company

Geachte heer Eyck,

Volgens de website [lareb.nl](http://lareb.nl) ontdekt Bijwerkingencentrum Lareb nieuwe kennis over bijwerkingen. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek naar alle meldingen. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel. Bijvoorbeeld informatie uit andere meldingen en wetenschappelijk onderzoek. Aangezien u volgens [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/raadvanvoorzitter) Voorzitter Raad van Toezicht bent, schrijf ik u aan.

Ik maak mij namelijk ernstige zorgen over de bijwerkingen en de hoogte van de kans op bijwerkingen betreffende het middel [VERZENIO- abemaciclib](https://www.verzenio.nl) tablet van Eli Lilly and Company. Volgens de website [lareb.nl](http://lareb.nl) ervaren mensen in 10 tot 30% van de gevallen de volgende bijwerkingen:

Blaasontsteking	Hoofdpijn	Ontsteking van het slijmvlies in de mond.
Bloedingen	Huiduitslag	Schimmelinfecties
Branderig gevoel in de mond	Jeuk	Steenpuisten
Diarree	Keelontsteking	Verkoudheid
Duizeligheid	Longontsteking	Vermoeidheid
Griep	Misselijkheid	
Haaruitval		

Mijns inziens is de behandeling van [borstkanker](https://www.kanker.nl/borstkanker) door middel van het proces van [autofagie](https://www.kanker.nl/autofagie), dat na [12 – 16 uur](https://www.kanker.nl/12-16-uren) vasten automatisch intreedt, een methode met veel minder en veel minder ernstige bijwerkingen. Deze behandelmethode werkt op twee manieren. Allereerst maakt het gebruik van het natuurlijke herstellende vermogen van het lichaam. Daarnaast zorgt het ervoor dat consumptiegewoonten die bijdragen aan kanker, zoals: [roken](https://www.kanker.nl/roken), [alcohol](https://www.kanker.nl/alcohol), [rood vlees](https://www.kanker.nl/rood-vlees), [niet-biologisch eten](https://www.kanker.nl/niet-biologisch-eten), [pannen met antiaanbaklaag](https://www.kanker.nl/pannen-met-antiaanbaklaag), etc. worden verminderd.

Als gevolg van een verslaving aan eten en drinken kunnen mensen moeite hebben met vasten. In een dergelijk geval is er een medicijn beschikbaar dat zich in Fase II van het klinisch onderzoek bevindt. Het gaat om het medicijn Lysergeenzuurdi-ethylamide ([LSD](https://www.kanker.nl/lsd)) van Joet. LSD is een agonisten of gedeeltelijke agonisten van de serotonine, maar het kan met lagere affiniteit binden aan andere receptoren zoals de sigma-1-receptor. Serotonine [vermindert de eetlust](https://www.kanker.nl/vermindert-de-eetlust) en ondersteunt het immuunsysteem door [ontstekingen](https://www.kanker.nl/ontstekingen) (een [belangrijk aspect bij de ontwikkeling van kanker](https://www.kanker.nl/belangrijk-aspect-bij-de-ontwikkeling-van-kanker)) te verminderen.

Kunt u mij aangeven welke rol Bijwerkingencentrum Lareb in deze situatie behoort te spelen?

Ik zie uw reactie graag tegemoet

Met vriendelijke groet,

Youri Hazeleger

0628428852

[joet@joet.nl](mailto:joet@joet.nl)