

Ook bij seksueel misbruik in kindertijd PSYTREC behandeling effectief



Centrale vraag

Reageren PTSS-patiënten die seksueel misbruikt zijn in de kindertijd slechter op traumagerichte behandeling dan PTSS-patiënten die op latere leeftijd (adolescentie of volwassenheid) seksueel misbruik hebben meegemaakt, of geen seksueel misbruik hebben meegemaakt?



Onderzoekers

Anouk Wagenmans,
Agnes van Minnen,
Marieke Sleijpen,
Ad de Jongh.



Resultaten

Percentuele afname in gemiddelde score op het Klinisch Interview PTSS (verschilscore in % van de beginscore):

- Patiënten die geen seksueel misbruik hebben meegemaakt: 59%
- Patiënten die vroegkinderlijk (<12 jaar) seksueel misbruik hebben meegemaakt: 45%
- Patiënten die in adolescentie (tussen 12 en 18 jaar) seksueel misbruik hebben meegemaakt: 46%
- Patiënten die in de volwassenheid (18 jaar en ouder) seksueel misbruik hebben meegemaakt: 55%




Conclusie

PTSS-patiënten die vroegkinderlijk seksueel misbruikt waren, profiteerden net zo goed van de behandeling als patiënten die op latere leeftijd seksueel misbruikt waren of andersoortige trauma's hadden meegemaakt.



Wie deden mee aan het onderzoek

185 patiënten met ernstige PTSS, waarvan 133 vrouw, die tussen januari en augustus 2016 behandeld werden bij PSYTREC



Publicatie

European Journal of
Psychotraumatology,
2018